

Strumento RAF

Principi attivi e FPI¹ più comuni, e le loro RAF² più frequenti tra gli ospiti di case di cura sopra i 65 anni

Principio attivo (esempio di preparato) e indicazione principale

Sistema nervoso

Analgescici

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Diclofenac (Voltaren[®]) Dolori				■	■		■		■			■	■		■
Fentanyl (Durogesic[®])³ Dolori	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ibuprofene (Brufen[®]) Dolori, febbre						■					■	■	■		■
Metamizole (Novalgin[®])⁴ Dolori, febbre															
Paracetamolo (Dafalgan[®]) Dolori, febbre															

Psicofarmaci/sedativi

Aloperidolo (Haldol[®])³ Schizofrenia, disturbi schizoaffettivi	■	■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Idrossizina (Atarax[®])⁴ Stati di ansia, prurito										■				■	
Lorazepam (Temesta[®])⁴ Disturbi del sonno, stati di ansia	■	■			■				■					■	
Oxazepam (Seresta[®]) Disturbi del sonno, stati di ansia		■	■		■				■					■	■
Pipamperone (Dipiperon[®])³ Psicosi croniche		■	■		■	■		■	■		■	■		■	
Quetiapina (Seroquel[®])³ Schizofrenia, disturbo bipolare			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Risperidone (Risperdal[®])³ Schizofrenia, sintomi psicotici	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zolpidem (Stilnox[®])³ Disturbi del sonno	■	■						■						■	■

■ RAF² frequenti o molto frequenti secondo l'informazione sul medicamento di Swissmedic.
 Nota: la mancanza del visto non significa che non possano verificarsi RAF.*

● FPI¹

RAF²

Agitazione/confusione
 Ansia/depressione
 Caduta/disturbo della deambulazione
 Cambiamenti valori di laboratorio
 Cambiamento di appetito/peso
 Debolezza/mancanza di forze
 Diarrea/costipazione/flatulenza
 Disturbi alle vie respiratorie
 Disturbi cardiovascolari
 Disturbi del sonno
 Disturbi motori
 Dolori (p. es. mal di testa)
 Edemi
 Emorragie
 Nausea/vomito
 Prurito/eruzione cutanea
 Secchezza della bocca
 Sintomi psicotici (p. es. delirio)
 Sonnolenza/stanchezza
 Urgenza di minzione/iscuria/incontin.
 Vertigini

- Farmacoterapie potenzialmente inadeguate
 - Reazioni avverse ed indesiderate a farmaci
 - Possono manifestarsi altre RAF frequenti o molto frequenti specifiche per il farmaco in questione. Sono state considerate primariamente le RAF con un'elevata rilevanza per il personale infermieristico.*
 - Possono manifestarsi altre RAF, la cui frequenza non è stimabile.*
- * Si prega di consultare le informazioni professionali per maggiori ragguagli.



patientensicherheit schweiz
sécurité des patients suisse
sicurezza dei pazienti svizzera

Principio attivo (esempio di preparato) e indicazione principale

RAF²

Agitazione/confusione
Ansia/depressione
Caduta/disturbo della deambulazione
Cambiamenti valori di laboratorio
Cambiamento di appetito/peso
Debolezza/mancanza di forze
Diarrea/costipazione/flatulenza
Disturbi alle vie respiratorie
Disturbi cardiovascolari
Disturbi del sonno
Disturbi motori
Dolori (p. es. mal di testa)
Edemi
Emorragie
Nausea/vomito
Prurito/eruzione cutanea
Secchezza della bocca
Sintomi psicotici (p. es. delirio)
Somnolenza/stanchezza
Vertigini

Metabolismo

Macrogol (Movicol®)⁴

Costipazione

Metoclopramide (Primperan®)

Nausea

Pantoprazolo (Pantozol®)^{3/4}

Reflusso gastrico, profilassi dell'ulcera

Paraffina (Paragol N®)

Costipazione

Vitamina D (Vi-De 3®)⁴

Carenza, osteomalacia

Vit. D + calcio (Calcimagon D3®)

Carenza, osteoporosi

Altri gruppi

Acido acetilsalicilico (Aspirine®)

Dolori, profilassi della trombosi

Belladonna (Escotussin®)

Tosse

Estriolo (Ovestin®, Blisсел®)⁴

Deficit estrogenico

Nitrofurantoina (Uvamin®)

Infezioni delle vie urinarie

Torasemide (Torem®)³

Iperensione, insufficienza cardiaca

Lacrime artificiali (Lacrycon®)

Occhi secchi

Urea (Excipial U®)

Cura della pelle

■ RAF² frequenti o molto frequenti secondo l'informazione sul medicamento di Swissmedic.

Nota: la mancanza del visto non significa che non possano verificarsi RAF.*

● FPI¹

1 Farmacoterapie potenzialmente inadeguate 2 Reazioni avverse ed indesiderate a farmaci

3 Possono manifestarsi altre RAF frequenti o molto frequenti specifiche per il farmaco in questione. Sono state considerate primariamente le RAF con un'elevata rilevanza per il personale infermieristico.*

4 Possono manifestarsi altre RAF, la cui frequenza non è stimabile.*

* Si prega di consultare le informazioni professionali per maggiori ragguagli.

Esclusione di responsabilità: i contenuti rappresentati sono esclusivamente a scopo informativo e formativo. Tutti i contenuti sono stati accuratamente verificati. Sicurezza dei pazienti Svizzera non assume alcuna responsabilità per l'attualità, la completezza e la correttezza dei contenuti.